

For Use in Broiler
Chicken Feeds Only

Monteban® 45

Narasin

TM

Net Weight **50 lbs**
(22.68 kg)

Type A Medicated Article

Do Not Feed Undiluted.

Active Drug Ingredient: Narasin..... 45 g per lb

For the prevention of coccidiosis caused by *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati*, and *E. maxima*.

Important: Must be thoroughly mixed in feeds before use.

Mixing Directions:

Type C Feeds - Amounts of Monteban 45 necessary to manufacture one ton of Type C medicated feed containing 54 to 90 g narasin are shown in the table. A preblend of Monteban in 15 - 20 lbs of feed should be made before incorporating into the total amount of finished Type C medicated feed.

The drug concentration should be adjusted to meet the severity of the coccidial challenge, which varies with environmental and management conditions.

Narasin Type C Concentration (Grams/Ton)	Monteban (Lbs/Ton of Type C Feed)
	<u>Lbs</u>
54	1.20
59	1.31
63	1.40
68	1.51
72	1.60
81	1.80
90	2.00

Type B Feeds - Amounts of Monteban 45 necessary to manufacture one ton of Type B medicated feed containing up to 5,400 g narasin are shown in the table.

Narasin Type B Concentration (Grams/Ton)	Monteban (Lbs/Ton of Type B feed)
1,350	30
2,700	60
5,400	120

Feeding Directions – Feed the resulting Type C medicated feed continuously as the sole ration.

CAUTION: Do not allow adult turkeys, horses or other equines access to narasin formulations. Ingestion of narasin by these species has been fatal.

NOT FOR HUMAN USE

WARNING: When mixing and handling Monteban, use protective clothing, impervious gloves and a dust mask. Operators should wash thoroughly with soap and water after handling. If accidental eye contact occurs, immediately rinse thoroughly with water.

Store at or below 25° C (77° F). Excursions permitted to 37° C (99° F). Not to be used after the date printed at top of bag.

Elanco, Monteban and the diagonal bar are trademarks owned or licensed by Eli Lilly and Company, its subsidiaries or affiliates.

Restricted Drug (California) - Use Only as Directed - NADA # 118-980, Approved by FDA

Elanco Animal Health
A Division of Eli Lilly and Company
Indianapolis, IN 46285, U.S.A.

To report adverse effects, access medical information, or obtain additional product information, call 1-800-428-4441.



Solo para uso en alimento
para pollos de engorde

Monteban® 45

Narasina

TM

Peso Neto: **22.68 kg**
(50 libras)

Artículo medicado tipo A

No administrar sin diluir

Principio activo: Narasina 100 g/kg (45 g/lb)

Para la prevención de la coccidiosis causada por *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati* y *E. maxima*.

Importante: Debe mezclarse bien con el alimento antes de usar.

Instrucciones de mezclado:

Alimentos tipo C: En la tabla se muestran las cantidades de Monteban 45 necesarias para elaborar una tonelada corta de alimento tipo C medicado que contenga de 54 a 90 g de narasina. Se recomienda hacer una premezcla de Monteban en 7 a 10 kg (15 a 20 lb) de alimento antes de incorporarla a la cantidad total del alimento medicado tipo C terminado.

La concentración del fármaco debe ajustarse de acuerdo con la gravedad de la infestación coccidial, que varía con las condiciones medioambientales y de manejo.

Narasina en concentración para alimentos tipo C (g/ton corta)	Monteban (lb/ton corta de alimento tipo C)	Narasina (g/ton métrica)	Monteban (kg/ton métrica)
<u>g</u>	<u>lb</u>	<u>g</u>	<u>kg</u>
54	1.20	60	0.600
59	1.31	65	0.650
63	1.40	70	0.700
68	1.51	75	0.750
72	1.60	80	0.800
81	1.80	90	0.900
90	2.00	100	1.000

Alimentos tipo B: En la tabla se muestran las cantidades de Monteban 45 necesarias para elaborar una tonelada corta de alimento medicado tipo B con un contenido de hasta 5,400 g de narasina.

Narasina en concentración para alimentos tipo B (g/ton corta)	Monteban (lb/ton corta de alimento tipo B)	Narasina (g/ton métrica)	Monteban (kg/ton métrica)
1,350	30	1,500	15.0
2,700	60	3,000	30.0
5,400	120	6,000	60.0

Instrucciones de administración: Administrar el alimento medicado tipo C resultante de manera continua como la única ración.

PRECAUCIÓN: No permita que pavos adultos, caballos u otros equinos tengan acceso a formulaciones con narasina. La ingestión de narasina por estas especies ha sido mortal.

NO USAR EN SERES HUMANOS

ADVERTENCIA: Cuando se mezcle o manipule Monteban use ropa protectora, guantes impermeables y mascarilla contra polvo. Los operarios deben lavarse bien con agua y jabón tras manipular el producto. Si ocurre contacto accidental con los ojos, se deberán enjuagar inmediatamente con agua abundante.

Conservar a una temperatura igual o menor a 25° C (77° F). Se permiten variaciones hasta 37° C (99° F). No se deberá usar después de la fecha impresa en la parte superior del saco.

Elanco, Monteban y la barra diagonal son marcas registradas o autorizadas por Eli Lilly and Company, sus subsidiarias o afiliadas

Medicamento Restringido (California) - Usar solo según las indicaciones - NADA# 118-980 - Aprobado por la FDA

Elanco Animal Health
Una división de Eli Lilly and Company
Indianapolis, IN 46285, Estados Unidos de América

Para notificar de efectos adversos, tener acceso a información médica u obtener información adicional sobre el producto, llame al 1-800-428-4441.